



Temps de saignement Méthode d'IVY

I – OBJET :

Ce mode opératoire décrit les différentes étapes à suivre pour réaliser le temps de saignement.
Le temps de saignement correspond au temps nécessaire à l'arrêt du saignement d'une lésion capillaire (formation du clou thrombocytaire).

II – DOMAINE D'APPLICATION :

Le temps de saignement n'est pas réalisé chez l'enfant de moins de 1 an. On proposera à la place un bilan sanguin Willebrand.

Ce mode opératoire concerne le personnel autorisé à effectuer les prélèvements sanguins, soit :

- Les biologistes,
- Les infirmières.

III – DEFINITIONS / ABREVIATION :

Néant

IV – DOCUMENTS DE REFERENCE :

Néant



V – CONTENU :

Matériel : Gants à usage unique Antiseptiques
Appareil à tension Compresse
Papier buvard Chronomètre
Dispositif à incision « Surgicutt » :

	Modèle	Référence
A partir de 15 ans	Surgicutt Adult	SU501
Pour les moins de 15 ans	Surgicutt Junior	SUJ501

Fournisseur :
ELITECH France
305, Allées de craponne
13 300 SALON DE PROVENCE
Tél. : 04.90.17.54.50

Technique :

Avant de commencer :

Se laver les mains

Mettre des gants

Vérifier l'identité du patient (nom, prénom, date de naissance) en lui demandant de formuler (si possible) son nom et le noter au centre du papier buvard.

Vérifier la concordance avec la prescription

Recueillir les renseignements cliniques et thérapeutiques nécessaires (ex : antiagrégants plaquettaires).

① **Poser le tensiomètre** et appliquer une pression permanente de **40 mm Hg**.



② **Désinfecter** la zone à inciser avec de la Bétadine dermique.

Pour les enfants d'un à 30 mois :PVP-I aqueuse ou soluté de Dakin

Pour les enfants de plus de 30 mois et les adultes :PVP-I alcoolique ou Chlorhexidine alcoolique ou Ethanol à 70 %

Attention : en cas d'allergie à la PVP-I, désinfecter avec du Dakin ou de la Chlorhexidine

③ **Faire une incision** avec le Surgicutt sur la face antérieure de l'avant bras en évitant les veinules superficielles, parallèlement au pli du coude.

(L'appareil permet une incision standardisée grâce à sa lame automatique).

Déclencher simultanément le chronomètre.

Eliminer le surgicutt dans le container pour DASRI coupant/tranchant



④ **Eponger le sang** toutes les **30 secondes** avec le papier buvard (sans frotter) jusqu'à ce que le sang ne le tache plus.



⑤ **Arrêter le chronomètre**, le temps de saignement est déterminé par le temps arrondi à 30 secondes.

Cessez l'observation à 10 mn



⑥ **Noter** sur l'ordonnance **le temps** écoulé depuis l'incision jusqu'à l'arrêt du saignement. Dans Glims, un résultat à 2 mn30 doit être saisi 2.30. Au-delà de 10 mn, saisir >10



Normale : < 8 mn

A savoir : certains médicaments, dont l'aspirine et le clopidogrel (Plavix), allongent le temps de saignement.

VI – EXEMPLAIRES EN CIRCULATION :

Nombre d'exemplaires	Localisation
3	Salles de prélèvement
1	Bureau de la qualitiennne
1	Guide des prélèvements (INTRANET)